

2020 感染

伊藤 路一

さんのお薬

<この表はあなたのお薬のはたらきや飲み方を説明したものです>

R 5. 6. 1 P 1 / 1 No. 5

No.	薬の名前・色／形・記号	薬の写真	用法				薬のはたらき	注意事項・相互作用・副作用など
			朝	昼	夕	寝		
# 1	ノルバスクOD錠 5mg 淡黄／錠剤 OD5:OD5 5 mgVIATRIS OD:OD		1				血圧を下げる薬です。 狭心症の発作を予防する薬です。	服用期間中、グレープフルーツジュースは避けてください。 めまい等が起こることがあるので、車の運転等危険を伴う作業には注意してください。 体がだるい、食欲不振、吐き気、嘔吐、皮膚のかゆみ、白目や皮膚が黄色くなる等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。 水なしで飲める薬です。舌の上で唾液を含ませ、唾液で飲み込んでください。また普通の薬と同じように水で飲んでもかまいません。 光と湿気を避けて保存してください。
# 2	アジルバ錠 10mg 微黄赤色／錠剤 10		1				血圧を上げる物質の働きを抑えて、血圧を下げる薬です。	血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作等には十分に気を付けてください。 室温で保管してください。
# 3	ビーエイ配合錠 白色－微黄白色／錠剤 ZE22		2	2	2		痛みや炎症を抑え、熱を下げる薬です。 風邪による鼻水、鼻づまり、のどの痛みなどに効く薬です。	アルコール類は、薬の作用を強めることがありますので避けてください。 眠気を催すことがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作等は控えてください。 他の医療機関で受診する場合は、このお薬の名前を医師または薬剤師に必ず伝えてください。 光の当たらない所に保管してください。
# 4	ラゲブリオカプセル 200mg 赤茶／赤茶／カプセル剤 82		4		4		ウイルスの増殖を抑える薬です。	呼吸困難、顔・舌・のど等のはれ、じんま疹等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。
# 5	カロナール錠 200 200mg 白／錠剤 SD 112: SD112 200mg:200mg						熱を下げたり、痛みを和らげる薬です。	飲酒の習慣のある方は、服用期間中お酒は避けてください。 体がだるい、食欲不振、吐き気、嘔吐、皮膚のかゆみ、白目や皮膚が黄色くなる等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。 空腹時を避けて服用してください。 アセトアミノフェンを含む他の薬との併用は避けてください。
*備考								
他の医療機関にかかる時は、この表を提示してください							医療機関 三重県四日市市日永1丁目3番地18号 すずらん診療所	
保険医師名 石川 義典 ご不明な点がありましたら、お問い合わせください くすりの詳しい情報は、以下のホームページでご覧になれます。 http://www.pmda.go.jp/pnavi-01.html							TEL 059-347-1118	