


No.	薬の名前・色／形・記号	薬の写真	用法				薬のはたらき	注意事項・相互作用・副作用など
			朝	昼	夕	寝		
#1	ザクラス配合錠HD 微黄／錠剤 275:20/5 275:HD		1				2種の成分が配合された、血圧降下薬です。	服用期間中、グレープフルーツジュースは避けてください。 めまい等が起こることがあるので、車の運転等危険を伴う作業には注意してください。 顔・唇・舌・のど等のはれが現れた時は、すぐにお知らせください。
#2	シングレアOD錠10mg 白／錠剤 :MSD710 OD10mg						鼻炎の症状を和らげる薬です。 気管支の収縮を抑えたり、気道の炎症を抑えたりする薬です。	体がだるい、食欲不振、吐き気、嘔吐、皮膚のかゆみ、白目や皮膚が黄色くなる等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。 服用直前にシートから取り出してください。 水なしで飲める薬です。舌の上で唾液を含ませ、唾液で飲み込んでください。また普通の薬と同じように水で飲んでもかまいません。
#3	ビラノアOD錠20mg 白／錠剤						かゆみを抑える薬です。 鼻炎の症状を和らげる薬です。	顔面蒼白、意識障害、冷や汗、呼吸困難、顔やまぶたのはれ、じんま疹等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。 水なしで飲める薬です。舌の上で唾液を含ませ、唾液で飲み込んでください。また普通の薬と同じように水で飲んでもかまいません。 空腹時に服用してください。
#4	シムピコートタービュヘイラー60吸入 白 赤 白～微黄白／吸入剤						気管支を拡張したり、気道の炎症を抑える薬です。	体がだるい、脱力感、筋力の低下、息苦しい等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。 自己判断で用量の変更や使用の中止をせず、指示通りに使用してください。 吸入後はうがいをしてください。うがいができない時は、口の中をすすいでください。 使用時以外は、キャップを閉めて保存してください。
#5	モーラステープL40mg 10cm×14cm ／貼付剤						炎症を抑え、痛みを和らげる薬です。	光線過敏症を起こすことがあるので、使用中、使用終了後も自分の間、患部が紫外線にあたらないように注意してください。 使用部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の症状が現れた時は、すぐに受診してください。 傷口、粘膜又は湿疹、発疹等のある部位には使用しないでください。

*備考

他の医療機関にかかる時は、この表を提示してください

保険医師名 石川 義典

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください

くすりの詳しい情報は、以下のホームページでご覧になれます。

<http://www.pmda.go.jp/pnavi-01.html>

医療機関 三重県四日市市日永1丁目3番地18号

すずらん診療所

TEL 059-347-1118